

Cloruro de Cetilpiridinio, D-Pantenol, Zinc Lactato y Aloe Vera.
Coadyuvante en el tratamiento de la Gingivitis



ENJUAGUE BUCAL PARA ENCÍAS SENSIBLES

Composición:

Cada 100 mL contiene:

Cloruro de cetilpiridinio.....0,05 g

Zinc Lactato.....0,08 g

Excipientes c.s.p.100,0 mL

Excipientes: Agua Purificada, Aceite de Menta Optamint, Colorante Azul No.1 CI No. 42090, Extracto de Aloe Vera, D-Pantenol, Glicerina, Mentol, Polietilenglicol 40 Hidrogenado, Sabor Hierba Buena, Sabor Menta, Sucralosa.

Descripción: **Gingivit[®] ENJUAGUE BUCAL** es una solución especialmente diseñada para el manejo y cuidado de las encías en casos de enfermedades inflamatorias e infecciosas de estas. Sus componentes han sido especialmente escogidos para obtener los mejores resultados en el tratamiento de la Gingivitis.

Acción farmacológica: Los componentes de **Gingivit[®] ENJUAGUE BUCAL** brindan acción antibacteriana, antiinflamatoria y regeneradora de los tejidos bucales. Además el usuario puede beneficiarse de su acción contra el mal aliento, tan frecuente en casos de enfermedades de las encías.

Indicaciones: **Gingivit[®] ENJUAGUE BUCAL** está indicado para el tratamiento de Gingivitis y enfermedad periodontal.

Dosis: Realice un enjuagatorio bucal con 10 a 15 mL tres veces al día.

Modo de empleo: Realice un enjuagatorio con 10 mL del enjuague bucal **Gingivit[®]**, después de cada cepillado. Enjuague su boca por 30 segundos y escupa.

Uso durante el embarazo y lactancia: Al ser un medicamento de acción local, **Gingivit[®] ENJUAGUE BUCAL** puede usarse en embarazo y lactancia bajo cuidado y vigilancia de un médico u odontólogo.

Duración del tratamiento: Al ser la gingivitis un problema bucal crónico, el cuidado y tratamiento deben mantenerse a largo plazo. La suspensión en el uso de **Gingivit[®] ENJUAGUE BUCAL** puede repercutir en el empeoramiento de los síntomas.

Interacciones: Ninguna conocida.

Precauciones: Manténgase alejado de los niños.

Advertencias: Si se interrumpe la rutina del tratamiento, los efectos beneficiosos pueden detenerse y retornar la gingivitis a su estado inicial. Si los síntomas persisten, consulte a su médico u odontólogo.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

Reacciones adversas: El cloruro de cetilpiridinio puede pigmentar levemente las piezas dentarias. Este efecto es poco frecuente y se resuelve al realizar una limpieza profiláctica con el odontólogo.

Tratamiento en caso de sobredosis: Si se ingiere accidentalmente una sobredosis de **Gingivit[®] ENJUAGUE BUCAL** se aconseja valorar el volumen ingerido, si este supera los 100 mL se debe considerar un lavado gástrico dentro de la primera media hora después de sucedido el incidente. Con volúmenes menores se recomienda la administración oral de agua y la vigilancia de los signos vitales.

Vía de administración: Tópica - Bucal

Presentaciones:

Frasco x 75 mL

Frasco x 300 mL

Frasco x 500 mL

Frasco x 940 mL

Conservar a temperatura no mayor a 30°C y alejado de la luz directa.

Elaborado por: Laboratorio Farmacéutico Lamosan Cía. Ltda.
Quito-Ecuador. Dirección: Pusuquí, Urb. John F. Kennedy, Calle Paseo Del Sol S6-574 y De Los Luceros.